

1922
Lane Medical Library

Beiträge

zur Kenntnis von bromierten Derivaten der
**4-Methyl-1,1'-Naphthyl-
Phenylketon-2'-Carbonsäure**

DISSERTATION

zur Erlangung der Doktorwürde

bei der philosophischen Fakultät
der hessischen Ludwigs-Universität
zu Giessen

eingereicht von
Heinrich Klös
aus Barmen
Rhld.



GIESSEN MCMXXII

1922

Beilage

zur Kenntnis von bromierten Derivaten der

4-Methyl-1'-Naphthyl-
Phenylketon-2'-Carbonsäure

Genehmigt durch den Prüfungsausschuss

am 11. März 1922

Berichterstatter: Dr. Elbs und Dr. Schaum.

der hessischen Ludwig-Universität
zu Gießen

angefertigt von
Heinrich Kläus
aus Bamberg
Kl. 11

GIESSEN MCMXXII


**Beiträge zur Kenntnis von
bromierten Derivaten der
4-Methyl-1,1'-Naphtyl-
Phenylketon-2'-Carbonsäure**




Digitized by the Internet Archive
in 2026

Theoretischer Teil.


Im Anschluß an die von Herrn Geheimrat Dr. Elbs begonnenen Untersuchungen auf dem Gebiet der Naphtoyl-o-benzoë-säure und des daraus zu gewinnenden Naphtanthrachinons hat^{M32;997-1018} zuerst auch Herr Professor Scholl das Methylnaphtalin in den^{C1912 I.; 492} Kreis seiner Untersuchungen gezogen. Seither ist sehr viel auf diesem Gebiet gearbeitet worden, und Herr Dr. Sievers hat sich in seiner Dissertationsschrift der Mühe unterzogen, alle einschlägige Literatur zusammenzustellen. Ich darf darum auf diese sehr vollständige Literaturangabe verweisen und werde selbst nur an mir besonders wichtig erscheinenden Stellen noch kurze Hinweise bringen. – Da man eben schon viele Seiten dieses Arbeitsgebietes kannte, aber noch nicht in allem einen klaren Ueberblick hatte, hatte Herr Geheimrat Professor Dr. Elbs sich die Aufgabe gestellt, möglichst alle hier vorkommenden Verhältnisse zu erforschen, und hatte mich beauftragt, zunächst einmal die Vorgänge bei der Bromierung zu studieren. Ich ging aus von der zuerst von Scholl^{M 32; 1005.} beschriebenen 4-Methyl-1,1'-Naphtyl-phenylketon-2'-karbon-^{C 1912; 492} säure.




Um für diese Säure noch ein möglichst gutes Charakteristikum zu bekommen, stellte ich zunächst in glatter Reaktion das Oxim dar.



Dann wandte ich mich meiner eigentlichen Aufgabe zu und bromierte mein Ausgangsmaterial. Ich wünschte bei möglichst niedriger Temperatur und mit Halogenüberträger zu arbeiten, um das Brom möglichst in einen Kern zu lancieren. Ich versuchte darum zunächst den niedrig siedenden Schwefelkohlenstoff als Verdünnungsmittel anzuwenden, gab es aber auf, als ich sah, daß sich Bromschwefel bildete und ich einen nun nicht Brom-, sondern schwefelhaltigen Körper erhielt, den ich aber nicht mehr weiter untersucht habe. Die Bromierung ist mir dann in Eisessig bei Wasserbadtemperatur in Gegenwart von Eisen als Bromüberträger gelungen. Ich stellte den erhaltenen Körper als ein Monobromderivat fest und wollte nun den Platz des Broms bestimmen. Daß ich dieses Ziel leider nicht ganz erreichen konnte, muß ich vorausschicken; doch habe ich im Verlauf meiner Untersuchungen eine ganze Reihe recht interessanter Beobachtungen gemacht. Zunächst versuchte ich, mit alkalischer Kaliumpermanganat-Lösung zu oxydieren, und erwartete durch das Ergebnis dieser Oxydation Auskunft darüber, ob das Brom in die Seitenkette oder in den Kern gegangen sei. Unter den verschiedensten Oxydationsbedingungen erhielt ich immer bromhaltige Oxydationsprodukte, ein Beweis, daß das Brom im Kern sitzt. Alle Oxydationen lieferten nur ganz geringe Ausbeuten bei einem Verbrauch von Kaliumpermanganat, der weit über die theoretisch errechnete Menge hinausging. Setzte ich nur diese theoretische Menge zu, so erhielt ich als Ergebnis immer Gemische mit meinem Ausgangsmaterial und nebenher hatte ein Teil des zugefügten Oxydationsmittels den ganzen Körper verbrannt, was man an der schon in der Kälte starken Kohlensäureentwicklung beim Ansäuern sehen konnte. Auch waren die Produkte der einzelnen Oxydationen anfangs nicht immer identisch, bis es mir unter den später genau festgelegten Bedingungen gelang, ständig daselbe Oxydationsprodukt, wenn auch in einer ganz schlechten Ausbeute, zu fassen. Ich hatte erwartet, bei der Oxydation werde eine Methylgruppe zu Carboxyl oxydiert, daß ich also aus der 4-Methyl-3 (?) -Brom-1,1' -Naphtyl-phenylketon-2' -karbonsäure eine 3 (?) -Brom-1,1' -Naphtyl-phenylketon 4,2' -dicarbonsäure (Bespprechung dieser Annahme der Bromsubstitution erfolgt weiter unten.) erhalten würde,




eine Säure, deren Entstehung durch die gefundenen Analysendaten sehr wahrscheinlich gemacht wird. Immerhin wäre noch eine andere Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß nämlich eine analoge Oxydation einträte, wie sie Graebe in seiner Arbeit beschreibt, als er die Naphtoyl-o-benzoëssäure zur Diphtaloylsäure oxydierte.





Sollte bei mir auch eine derartige bromhaltige Diphtaloylsäure (Benzil-o-Dicarbonsäure) vorliegen, so würde immerhin bei der Brombestimmung zwischen beiden theoretischen Werten eine Differenz von 1,17 % sein. Da auch der Schmelzpunkt meines Körpers trotz mehrfachen Umkristallisierens sich nicht genügend hoch fand, glaube ich nicht an die Entstehung einer bromierten Diphtaloylsäure. Sollte ein anderer nach mir doch diesen Körper als Diphtaloylsäurederivat identifizieren, so würde damit zugleich die Entscheidung gefallen sein, daß das Brom in den bisher unsubstituierten Naphtalinkern eingetreten ist, und damit meine Annahme hinfällig. Es sind auch schon einmal halogensubstituierte Naphtoyl-o-benzoëssäuren oxydiert worden von Heller und zwar die 4-Chlor-1,1'-Naphtyl-phenylketon-2'-karbonsäure (Formel I) und die 3-Chlor-2,1'-Naphtylphenylketon-2'-karbonsäure (Formel II).

B 45; 665
C 19121; 1466



In beiden Fällen hat auch er nicht die Konstitution der entstandenen Säuren nachweisen können und begnügt sich mit der Feststellung, eine „einheitliche chlorhaltige Säure“ bei der Oxydation erhalten zu haben. Mit Bestimmtheit ausagen kann ich also auf Grund meiner Versuche, daß das Brom nicht in die Seitenkette gegangen ist, und daß ich eine bromhaltige Dicarbonsäure erhalten habe von noch unbekannter Konstitution. Um nun Gewißheit zu bekommen, ob meiner Annahme gemäß das Brom

in dem Naphtylrest oder wider alles Erwarten doch in den Phenylrest gegangen sei, führte ich die „Kalischmelze“ aus und erhielt dabei Benzoësäure und einen in saurer Lösung mit Wasserdampf nicht flüchtigen verharzten bromhaltigen Körper, aus dem ich nichts Analysenfähiges herausholen konnte. Damit glaube ich bewiesen zu haben, daß die Bromsubstitution im Naphtalinkern eingetreten ist. Es handelte sich nun für mich darum, die Stelle des Bromeintrittes in den Naphtalinkern festzulegen. Für das wahrscheinlichste hielt ich die Konstitution einer 4-Methyl-3-Brom-1,1'-Naphtyl-phenylketon-2'-Carbonsäure, also Formel I



denn das Vorhandensein der Methylgruppe, die einen neuen Substituenten bei schon besetzter p-Stellung in die o-Stellung dirigiert, sowie der Phthaloylrest, der das Brom in die m-Stellung zu drängen bestrebt ist, unterstützen sich und machen die Stellung in 3 für das Brom am einleuchtendsten. In Frage hätte nun noch eine Substitution im noch unangegriffenen Naphtalinkern kommen können, und dann wäre wohl nach den allgemeinen Substitutionsregeln hauptsächlich die Stellung 5 in Betracht gekommen. Doch machen Untersuchungen von Scholl beim 1,2-Benz-3-Methylanthrachinon einen solchen Eintritt höchst unwahrscheinlich; da er aus dem Verhalten dieses Körpers den Schluß zieht, eine Methylgruppe erschwere, eventl. sterisch, den Eintritt eines neuen Substituenten in die Peristellung. Ich wollte nun zunächst einmal dadurch, daß ich durch Kondensation meiner bromierten Säure ein bromhaltiges Methylbenzanthrachinon zu erhalten suchte, die Stellung des Broms in 2 ausschalten. (Formel II wäre dann also nicht mehr in Betracht gekommen). Diese Kondensation ist mir trotz aller Bemühungen nicht gelungen. Ich erhielt immer ein schon in verdünnten Alkalien lösliches Produkt, das noch Brom enthielt. Eine Sulfogruppe konnte ich in ihm nicht feststellen, und ich vermute, daß durch die konzentrierte Schwefelsäure eine weitgehende Oxydation eingetreten ist, da man bei der Kondensation immer eine Bildung von Schwefeldioxyd bemerken konnte. Eine derartige Unmöglichkeit der Kondensation spricht durchaus noch nicht für die Konstitution, die ich gerade ausschließen wollte, denn gerade auf diesem Gebiet haben schon mehrere solcher Keton-o


Carbon Säuren sich nicht kondensieren lassen, und so liegt in dem Verhalten meiner Säure durchaus nichts Frappierendes. Ich erinnere da an Graebe, der auf keine Art und Weise die Naphthoyl-o-tetrachlorbenzoesäure kondensieren konnte, und Scholl gelang es, wie er uns mitteilt, nicht, die 5-Methyl-6-Methoxy-1,1'-Naphthyl-Phenylketon-2'-Carbonsäure (nachstehende Formel)

A 340; 259

C 1905 II; 485

M 33; 507-533


C 1912 II; 512




zu kondensieren, sondern er mußte erst den Umweg über das durch Reduktion erhältliche Methanderivat (Formel II) einschlagen. Auch ich wollte diesen Umweg gehen, erhielt aber bei der von Scholl angegebenen Reduktionsmethode in alkalischer Lösung den schon von diesem selbst beschriebenen Körper der untenstehenden Formel; demnach war auch das Brom heraus-


M 32; 1007

C 1912 I; 492




reduziert worden, und dieser Weg für mich ungangbar. Ich versuchte dann auch in saurer Lösung die Reduktion zu bewerkstelligen, und behielt dabei auch wirklich das Brom im Reduktionsprodukt, doch war die Reduktion auch nur über ein nicht isolierbares Zwischenprodukt bis zum Laktone gegangen, das sich seinerseits auch unter keinen Umständen kondensieren ließ.







Da ich ja nun die 4-Methyl-1,1'-Naphtyl-Phenyl-Methan-2'-Carbonsäure hatte, habe ich sie auch einmal vergleichsweise kondensiert und erhielt schon nach 2-3minütigem Stehen bei Zimmertemperatur über ein sehr unbeständiges Zwischenprodukt der Formel I hinweg das 1,2-Benz-3-Methylanthrachinon; (Formel II)



ein Beweis für die an sich unerklärliche Tatsache, daß Methan-carbonsäuren immer schneller sich kondensieren lassen als die entsprechenden Keton-säuren. Um aber kein Mittel unverfügt zu lassen, wollte ich in meiner bromierten Keton-säure das Brom durch die Anilidogruppe ersetzen und glaubte so einen Körper erhalten zu können, den man ohne Schaden zu einer Methan-carbonsäure reduzieren könnte, um dann die Kondensation vorzunehmen. Doch auch hier war mir ein Erfolg versagt, und ich konnte beim Behandeln mit Anilin nur ein anscheinend sehr hochmelukulares, noch alles Brom enthaltendes Produkt isolieren, über dessen Konstitution ich nur Vermutungen haben kann, daß etwa die Aminogruppe mit der Ketongruppe reagiert hat, und dann eine weitgehende Polymerisation eingetreten ist, wie solche auf diesem Gebiet durchaus nicht selten sind. Daß das Kernhalogen in den Körpern dieser Reihe außerordentlich fest sitzt und sich

selbst nicht bei Gegenwart der Ullmann'schen Kupferbronze C durch die Amino- oder auch Phenoxygruppe ersetzen läßt, gibt schon Levi in seiner Arbeit an, die er unter Ullmann gemacht hat. Bei ihm handelte es sich zwar im Speziellen um das 4-Bz-Chlor-1,2-Benzanthrachinon der Formel I.

Inaug- Diss.
Rostock 1913



Ich habe dann noch versucht, durch direkte Bromierung des schon fertigen Methyl-Naphtanthrachinons (nach Scholl 1,2-Benz-3-Methyl-Anthrachinons) zu Substitutionskörpern dieser Reihe zu gelangen, um eventl. Rückschlüsse daraus ziehen können. Doch mußte ich die Angaben von Scholl durchaus bestätigen, denn bei allen nur möglichen Reaktionsbedingungen trat das Brom in die Seitenkette und ich erhielt das 1,2-Benz-3-Brommethyl-Anthrachinon (Formel II.)

M 32; 1012
C 1012 I; 492

Experimenteller Teil.

I. 4-Methyl-1,1'-Naphthyl-Phenylketon-2'-Carbon säure.


B 41; 3633

C1908 II; 1927

Inaug. Diss.


Giessen 1921

Diefen Körper, den ich zum Ausgangsprodukt hatte, erhielt ich nach der Heller'schen Methode, zu der unter Anleitung von Herrn Geheimrat Dr. Elbs Herr Dr. Sievers die günstigsten Reaktionsbedingungen ausgearbeitet hat. Nach seinen Angaben brachte ich 148 gr (1 Mol.) Phtalsäureanhydrid mit 190 gr (1 Mol.) Methylnaphtalin und 312 gr (4 Mol.) Benzol in einen großen Rundkolben und baute ein Rührwerk mit möglichstem Feuchtigkeitsabschluß ein. Nachdem unter stetem Rühren der größte Teil des Anhydrids in Lösung gegangen war, gab ich durch das seitliche Ansatzrohr 295 gr (d. h. die doppelte Gewichtsmenge des angewandten Anhydrids) Aluminiumchlorid fein gepulvert und vollkommen trocken in einzelnen Portionen zu 12–15 gr hinzu und regelt das Zufügen neuer Mengen von Aluminiumchlorid so, daß niemals eine höhere Temperatur als 40–45 Grad im Kolben entstand. Nach 1 bis 1 Stunde war alles Aluminiumchlorid zugefügt. Die Reaktionsmasse verfärbte sich über dunkelbraun nach schwarz hin, und entwickelte viel Salzsäure, die durch den Kühler entweichen konnte.




Ich überließ dann die Masse bei ständigem Rühren 8–9 Stunden sich selbst, bis die anfangs so lebhafte Salzsäureentwicklung völlig beendet war und der ganze Kolbeninhalt eine sirupöse teerartige Masse war. Nun gab ich vorsichtig durch das Kühlrohr 250–300 ccm Eiswasser zu, worauf, besonders bei leichtem Umschütteln, unter starker Erwärmung und sehr lebhafter Salzsäureentwicklung die Zersetzung des noch vorhandenen über-

schüssigen Aluminiumchlorids und der anderen chlorhaltigen Aluminiumsalze vor sich ging.




Dann wurde die Zersetzung im Wasserdampfstrom zu Ende geführt und dabei unverändertes Methylnaphtalin und das gesamte „Verdünnungsbenzol“ übergetrieben und wiedergewonnen. Die Lösung von Methylnaphtalin in Benzol ließ sich vom Wasser im Scheidetrichter trennen und konnte nach sorgfältigem Trocknen wieder bei der nächsten Kondensation benutzt werden. War das übergehende Destillat vollkommen klar, d. h. alle Kohlenwasserstoffe schon übergetrieben, was nach 2–3 Stunden der Fall war, so goß ich die überstehende Flüssigkeit, die etwa noch unveränderte Phtalsäure enthielt, von dem gebildeten braunschwarzen Harzklumpen ab und gab zu diesem kristallisierte Soda bis zur stark alkalischen Reaktion. Dann wurde erneut Wasserdampf durchgeleitet, und unter starkem Aufschäumen bildete sich das in Wasser leicht lösliche Natrium Salz meiner Säure.



Nach 1–2 Stunden Durchleiten saugte ich das Ganze ab und unterwarf den Rückstand noch 2mal derselben Behandlung mit Soda und Wasserdampf. Die erhaltenen rotbraunen Filtrate wurden noch heiß mit technischer Salzsäure veretzt, und aus ihnen die freie Säure in Form einer klebrigen, hellbraunen plastischen Masse gefällt, die nach dem Ausdrücken des meißten ihr mechanisch beigemengten Wassers allmählich von selbst, schneller beim Abkühlen in kaltem Wasser kristallin und damit spröde wurde. Wenn man die Fällung in der Kälte vornahm, so erhielt man ein schwammiges, noch viel Wasser enthaltendes Produkt,

das man nur sehr schlecht trocknen konnte. Die in der Hitze gefällt und dann kristallin gewordene Rohsäure trocknete ich 3 Stunden lang auf dem Wasserbad, wobei sie in dem noch immer mechanisch beigemengtem Wasser schmolz, und konnte sie dann nach dem Trocknen leicht pulverisieren. Ich erhielt 273 gr (d. h. 95% der theoretischen Ausbeute, berechnet auf das angewandte Phtalsäureanhydrid.) dieser lufttrocknen Rohsäure. Zur Reinigung kochte ich die gepulverte Rohsäure mit 167 gr (2 Mol.) Magnesiumkarbonat und Wasser 6–8mal gründlich auf, wobei sich viel Kohlenäure entwickelte, und saugte nach jedem Aufkochen die heiße Lösung sofort ab. Im Laufe einer Nacht kristallisierte aus diesen hellgelben Filtraten das in Wasser mittelschwer lösliche Magnesiumsalz aus. Aus der Mutterlauge wurde in der Hitze dann eine nun schon viel reinere Rohsäure ausgefällt, die nochmals der Reinigung über das Magnesiumsalz unterworfen wurde. Ich erhielt 175 gr schneeweißes lufttrockenes Magnesiumsalz entsprechend einer Ausbeute von 57% der Theorie, und gewann 92 gr, also 32% der Rohsäure, zurück. 10 gr dieses Magnesiumsalzes löste ich nun in etwa 2 Ltr. kochendem Wasser, filtrierte die etwas getrübbte Lösung durch und fälltte in der Kälte mit reiner Salzsäure die freie 4-Methyl-1,1'-Naphtyl-phenylketon-2'-Carbonsäure in Flocken aus. Diese saugte ich ab, trocknete sie auf dem Wasserbad und dann im Trockenschrank bei 110 Grad, kristallisierte sie 2mal aus möglichst wenig Benzol um und fand dann nach mehrtägigem Stehen im Exsiccator ihren Schmelzpunkt konstant bei 166 Grad, während Scholl 167 Grad angibt. Physikalische und chemische Eigenschaften dieser Säure sind schon beschrieben worden, und es erübrigt sich daher für mich ein näheres Eingehen darauf.

II. Oxim der 4-Methyl-1,1'-Naphtyl-Phenylketon-2'-Carbonsäure.




29 gr reiner 4-Methyl-1,1'-Naphtyl-Phenylketon-2'-Carbonsäure (1/10 Mol.) werden zusammen mit 20 gr (3/10 Mol.) salzsaurem Hydroxylamin und 112 gr 50prozentiger Kalilauge

(10·10 Mol.) 6 Stunden bei kleiner Flamme am Rückflußkühler im Sieden gehalten, wobei zum Schluß eine immer stärker werdende Zerletzung des überschüssigen freien Hydroxylamins sich durch Ammoniakgeruch bemerkbar machte. Das Reaktionsgemisch wurde dann noch heiß filtriert und mit verdünnter Salzsäure schwach angesäuert, worauf sich ein flockiger weißer Niederchlag absetzte. Nach einträglichem Stehen konnte ich ihn absaugen und leicht in wenig heißem Alkohol lösen. Beim Erkalten der Lösung schied sich das Oxim reichlich und gut kristallin aus und zeigte nach dem Trocknen einen Schmelzpunkt von 160 Grad. Noch 3maliges Umkristallisieren aus Alkohol ergab einen festen Schmelzpunkt von 171 Grad. Die qualitative Prüfung des Oxims auf Stickstoff versuchte ich, da ich gerade kein metallisches Kalium zur Verfügung hatte, durch Verschmelzen mit metallischem Natrium und dann nach dem gewöhnlichen Arbeitsgang zu bewerkstelligen. Doch bekam ich keine Berliner-Blau-Reaktion; und Natrium ist demnach für die Zerletzung von solchen Oximen unbrauchbar. Da der gefundene Schmelzpunkt sehr nahe mit dem meines Ausgangsmaterials zusammenfällt, stellte ich zunächst durch Vermischen der beiden reinen Substanzen ein Gemisch her, das infolge von gegenseitiger Schmelzpunktserniedrigung schon bei 141 Grad schmolz. Damit war die Nicht-Identität beider Körper sichergestellt. Aufklärung gab dann endgültig die Stickstoffbestimmung nach der Methode von Dumas. Analysiert wurde dabei das Oxim nach 3wöchigem Stehen im Chlorcalcium-Exsiccator.


- 1). Angewandte Substanz: 0,0982 gr
 Abgelesenes Stickstoffvolumen 3,8 cbcm
 (über 50⁰/₁₀ iger Kalilauge bei 13 Grad und 734 mm Luftdruck)
 Gefundener Stickstoff: 4,46 %
- 2). Angewandte Substanz: 0,1035 gr
 Abgelesenes Stickstoffvolumen 4,05 cbm
 (über 50⁰/₁₀ iger Kalilauge bei 12 Grad und 720 mm Luftdruck)
 Gefundenen Stickstoff: 4,44 %

Theoretisch sollte das Oxim $C_{19}H_{15}O_3N$ 4,59 % Stickstoff enthalten. Das Oxim ist ein weißes, nach einiger Zeit auch im verschlossenen Gefäß sich etwas gelb färbendes kristallines Pulver; es löst sich nicht in Wasser, verhältnismäßig leicht schon in ganz verdünnten Alkalien und Ammoniaklösungen. In heißem Alkohol löst es sehr leicht, in kaltem sehr schwer löslich. Auch in Aether, Benzol, Eisessig usw. geht es, wenn auch zum Teil etwas schwerer, in Lösung. Im Gegensatz zu der einfachen Säure hat es einen weit weniger bitteren Geschmack als diese. Die Ausbeute an reinem Oxim beträgt etwa 53⁰/₁₀, die des Rohoxims 80⁰/₁₀.

III. 3(?)-Brom-4-Methyl-1,1'-Naphtyl-Phenylketon-2'-Carbonfäure.



30 gr (1/10 Mol.) Magnesiumsalz meines Ausgangsproduktes löste ich in der Wärme in der dreifachen Menge Eisessig auf unter Zusatz von noch etwa $\frac{1}{2}$ gr grober Eisenfeilspäne. Durch den aufgesetzten Rückflußkühler gab ich dann 23 gr Brom, (berechnet hatte ich 16 gr gleich 2,10 Mol. zur Bromierung und 7 gr, falls das Brom schon mit dem gebildeten Magnesiumacetat reagieren sollte) mit Eisessig aufs dreifache Volumen verdünnt hinzu. Unter lebhafter Bromwasserstoffentwicklung ging die Reaktion vor sich.



Ich hielt nun das Ganze 4–5 Stunden auf kochendem Wasserbad, bis der Luftraum über der Flüssigkeit farblos war, und brachte sie dann zur Beendigung der Reaktion noch für $\frac{1}{2}$ Stunde mit kleiner Flamme zum Sieden. Mit ganz verdünnter Salzsäure fällte ich noch in der Hitze aus der braunroten Reaktionsflüssigkeit eine dunkelrote bis schwarze klebrige Masse, die bei Zimmertemperatur im Sommer nicht fest wurde. Sie löste sich nicht in Wasser und Benzin, sehr leicht in allen üblichen Lösemitteln, wie Alkohol, Aether, Benzol, Toluol, Eisessig, Anilin usw. und war dann nicht mehr aus diesen, außer durch Fällung mit Wasser, zurückzugewinnen. Nach 6stündigem Trocknen auf dem Wasserbad erhielt ich 40 Gramm (etwa 105% der Theorie) dieses Rohproduktes. Ich kochte es dann auch mehrfach mit der 3 bis 4fachen theoretischen Menge Magnesiumcarbonat und Wasser aus, doch schied sich wegen der leichten Löslichkeit des Magnesiumsalzes dieses beim Abkühlen aus dem abgefaugten tief-dunkelbraunen

Filtrate nicht aus. Ein Konzentrieren dieser Lösung durch Eindampfen verbot sich auch, weil dabei die vorher ganz klare Lösung trüb wurde durch irgendeine Zersetzung des Salzes. Dieselbe Beobachtung habe ich schon bei der Mutterlauge des Magnesiumsalzes meiner Ausgangssäure und dann auch bei der Lösung des noch zu beschreibenden Bariumsalzes dieser bromierten Säure gemacht. Ich fällte darum aus der Magnesiumsalzlösung die freie bromierte Säure durch Salzsäure wieder aus und erhielt sie diesmal schon in einer weit helleren und nicht mehr klebrigen Form. Getrocknet erhielt ich von diesem so gereinigten Produkt nur noch 28 gr d. h. 75% der Theorie. Ich löste es in möglichst wenig heißem Alkohol, dem ich dann bis zur beginnenden Trübung heißes Wasser zufügte. Nach mehrstündigem Stehen hatte sich am Boden eine rötliche Kristallkruste abgesetzt, die ich durch Absaugen von dem ganz dunkelrot-braunen Alkohol trennte, mit frischem Alkohol nachwusch und dann noch 5 mal in derselben Art und Weise aus Alkohol umkristallisierte. Dann erst erhielt ich einen einwandfreien Schmelzpunkt von 204,5 Grad. Mit zunehmender Reinheit löste sich übrigens der Körper immer schwerer in Alkohol. Der neue Körper ist schwach gelblich gefärbt und läßt sich recht schön in kleinen Kriställchen erhalten; ganz feines Kristallpulver ist fast farblos. Größere Kristalle zu etwaigen kristallographischen Messungen zu züchten, ist mir nicht möglich gewesen. Im Mikroskop zeigt sich an den kleinen Kriställchen nadelige und auch tafelige Ausbildung; die Nadeln löschten schief aus, woraus man mit ziemlicher Sicherheit auf Zugehörigkeit zum monoklinen oder triklinen Kristallsystem schließen kann. Versuche, ein Axenbild mit Hilfe der konoskopischen Beobachtung zu erhalten, um daraus zwischen den beiden Systemen die letzte Entscheidung zu treffen, führten auch wegen der geringen Dimensionen der Kriställchen zu keinem Ergebnis. Bei Versuchen zur ungefähren Festlegung des Brechungsexponenten, den ich durch den hochgliedrigen Komplex und dann durch das Brom sehr hoch schon annahm, fand ich ihn noch höher als den des Jodmethylen, also höher als 1,73, nach der Schröder-Van-der-Kolk'schen Einbettungsmethode. Die Säure löst sich dabei in Jodmethylen auf zu einer Lösung von noch höherem Brechungsexponenten. Doch liegt ihr Brechungsexponent noch unter dem einer Schmelze aus 17,6 % Selen und 82,4 % Schwefel, die neuerdings zu mineralogischen Bestimmungen vielfach verwandt wird und den Brechungs-Exponenten 2,025 hat. Unter dem Polarisationsmikroskop läßt der bromierte Körper eine starke Doppelbrechung erkennen. Nach dem Schmelzen erstarrt er nicht sofort wieder kristallin, sondern glasig, kenntlich an dem Auftreten einer nur recht schwachen Spannungsdoppelbrechung. In konzentrierter Schwefelsäure löst er

sich mit blauvioletter Farbe. Die Lösemittel, die für das Rohprodukt angegeben sind, kommen auch beim Reinprodukt in Frage. Die Ausbeute an Reinprodukt konnte ich im Laufe der Arbeit günstigstens auf 24% steigern, doch wird aus den alkoholischen Flüssigkeiten immer noch viel Rohprodukt regeneriert. Qualitativ konnte ich in der Säure das Brom mit Kupferoxyd durch die Halogenkupferbildung in der Flamme sehr bequem nachweisen. Die Brombestimmung ergab, daß es sich um ein Monobromderivat handelt. Vor der Analyse hatte die Säure 14 Tage im Exsiccator gestanden.

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1.) Angewandte Substanz: | 0,1994 gr. |
| Gewogen Bromsilber: | 0,1016 gr. |
| Berechnet daraus Bromgehalt: | 21,682 % |
| 2.) Angewandte Substanz: | 0,2802 gr. |
| Gewogen Bromsilber: | 0,1422 gr. |
| Daraus berechnet Bromgehalt: | 21,596 % |

Theoretisch hätte ich in $C_{19}H_{13}O_4Br$ finden müssen 21,657% Brom. Hiermit überein stimmen auch meine beobachteten Titrationswerte. Ich löste eine abgewogene Menge Säure in einem Ueberschuß von kohlenstofffreier 1/10 n. Natronlauge auf dem Wasserbad auf und titrierte dann den Ueberschuß der Natronlauge mit 1/10 n. Salzsäure zurück.

Die Daten der Titration sind folgende:

- | | |
|--|------------|
| 1.) Angewandte Säure: | 0,1823 gr. |
| Verbrauchte Menge 1/10 n. Natronlauge: | 4,96 ccbm. |
| Läßt rückschließen auf einbasische Säure vom Molekulargewicht: | 367,54 |
| 2.) Angewandte Säure: | 0,2212 gr. |
| Verbrauchte Menge: 1/10 n. Natronlauge: | 6,02 ccbm. |
| Läßt rückschließen auf einbasische Säure vom Molekulargewicht: | 367,44 |

Das wirkliche Molekulargewicht dieser Säure ist 369,02. Zur näheren Charakterisierung dieser Säure habe ich auch einige Salze derselben dargestellt.

- a) Magnesiumsalz: Ein Teil der bei der Reinigung der Säure erhaltenen Lösung des Magnesiumsalzes wurde auf den achten Teil des ursprünglichen Volumens eingedampft. Schon im Anfang des Eindampfens war die oben beschriebene Trübung eingetreten, und wenn die angegebene Konzentration erreicht war, schied sich neben solchen Verunreinigungen schon sehr viel Magnesiumsalz ab. Jetzt laugte ich das Ganze noch siedend heiß ab und erhielt nach dem Stehen über Nacht aus dem Fil-

trat einen schwach gelb-braunen Körper, den ich dann zweimal aus wenig Wasser und noch einmal aus wenig heißem Alkohol umkristallisierte. Das Magnesiumsulfat ist dann ganz weiß; es löst sich sehr leicht in Wasser und auch in Alkohol. Zur Analyse wurde einmal das sorgfältig getrocknete Salz mit etwas konzentrierter Schwefelsäure und rauchender Salpetersäure in einem kleinen gewogenen Tiegel im Luftbad behandelt, und wenn dann alle organische Substanz durch Glühen zerstört war, wurde der Rückstand nochmals mit etwas Schwefelsäure befeuchtet, und der Boden des Tiegels auf ganz schwache Rotglut gebracht. Nach dem Erkalten im Exsiccator wog ich das gebildete Magnesiumsulfat und berechnete daraus den Magnesiumgehalt.

Angewandte Substanz 0,4958 gr.

Gewogenes Magnesiumsulfat: 0,0756 gr.

Daraus berechnet Magnesiumgehalt: 3,08 %

Da dieser Wert mir von dem theoretisch geforderten von 3,198 % für $(C_{19}H_{12}O_3Br)_2Mg$ zu sehr zu differieren schien, zerstörte ich in einer zweiten Probe die organische Substanz durch Schmelzen mit Salpeter und Kaliumchlorat, brachte die Schmelze dann mit ganz verdünnter Salzsäure klar in Lösung und bestimmte auf die gewöhnliche Art und Weise das Magnesium als Pyrophosphat, nachdem ich es als Magnesiumammoniumphosphat gefällt hatte. Ich erhielt dabei folgende Daten:

Angewandte Substanz: 0,6321 gr

Gewogenes Magnesiumpyrophosphat: 0,0903 gr

Daraus berechnet Magnesiumgehalt: 3,12 %

b) Bariumsalz: In einer Porzellanschale kochte ich die reine Säure mit der fünf- bis sechsfachen Menge Bariumkarbonat, als es die Theorie erfordern würde, mehrmals analog der Magnesiumsalzdarstellung auf und engte dann nach jedesmaligem Abaugen das Gesamtfiltrat wieder solange ein, bis eine starke Kristallabscheidung schon in der Hitze begann. Wie beim Magnesiumsalz erhielt ich beim Erkalten der noch heiß sorgfältig filtrierten Lösung eine Abscheidung von Bariumsalz, das ich nach zweimaligem Umkristallisieren aus Wasser und nochmaligem aus Alkohol analysenfähig erhielt. Das Bariumsalz ist fast weiß, löst sich in Wasser und Alkohol gut mit schwach gelblicher Farbe. Ich dachte in ihm einen Körper mit noch höherem Brechungsvermögen zu haben als die freie Säure und wandte darum auch auf dieses Salz die Schröder-Van der Kolk'sche Einbettungsmethode an. Anlässlich von Versuchen auf diesem Gebiet stellte ich fest, daß sich dieses Salz sehr leicht noch in Chlornaphthalin, Bromnaphthalin, Zimtöl, Nitrobenzol und Jodmethylen löst. Ich beobachtete an ihm anfangs einen höheren Brechungsindex als den des Jodmethylen, doch schon nach wenigen Augenblicken hatte die Flüssigkeit so viel Bariumsalz gelöst, daß die Lösung eine stärkere Brechung als das noch ungelöste Salz zeigte. Die Bariumbestimmung des gut getrockneten Körpers machte ich analog der zuerst beschriebenen Methode meiner Magnesiumbestimmung. Ich fand:

1.) Angewandte Substanz: 0,5255 gr.

Gefunden Bariumsulfat: 0,1405 gr.

Daraus berechnet Bariumgehalt: 15,73 %

2.) Angewandte Substanz: 0,5791 gr.

Gefunden Bariumsulfat: 0,1544 gr.

Daraus berechnet Bariumgehalt: 15,69 %

Die Theorie verlangt von einem Salz der Zusammensetzung $(C_{19}H_{12}O_3Br)_2Ba$ 15,72 % Barium.

c) Versuche zur Darstellung des Kupferfalzes. Zu der Magnesiumfalzlösung, wie ich sie beim Reinigen der Rohsäure erhielt, gab ich eine ganz verdünnte Kupfervitriollösung, worauf eine blau-grüne Trübung entstand, aus der sich im Verlauf von einigen Stunden ein grüner Körper abgesetzt hatte. Kristalle konnte ich bei ihm nicht bemerken. Ich dekantierte nun den Niederschlag so lange mit frischem Wasser, bis ich in der ablaufenden Wässrigkeit mit Ammoniak kein Kupfer-Ion mehr nachweisen konnte. Dann brachte ich den Niederschlag auf ein Filter und trocknete ihn. Sonderbar berührte es mich, daß bei einem zweiten Versuch unter gleichen Bedingungen ich einen solchen von blauer Farbe erhielt. Angestellte Kupferbestimmungen als Sulfür nach Zerstörung der organischen Substanz mit Salpeter und Kaliumchlorat und nachfolgender Fällung des Kupfers als Sulfid ergaben Werte, die 3-5 fach höher waren als die verlangten theoretischen. Ich schließe daraus, daß das nicht kristallin, sondern anscheinend kolloidal sich bildende Kupferfals aus der Vitriollösung noch Kupfer adsorbiert. Jedenfalls konnte ich nach dieser angegebenen Verluhsanordnung weder das Kupferfals noch sonst ein Schwermetallfals einwandfrei isolieren.

d) Ammoniumfals: In heiße verdünnte Ammoniakflüssigkeit gab ich einen Ueberschuß an reiner Säure und filtrierte nach einiger Zeit die Ammoniumfalslösung von ungelöst gebliebener Säure ab und ließ im Exsiccator das Wasser verdunsten, bis eine noch stark gelb gefärbte Masse zurückblieb, die nach 2 maligem Umkristallisieren aus ganz wenig Alkohol und nach fast völligem Verdunsten desselben zwar noch nicht unbedingt rein war, doch zur Analyse genommen werden mußte, wenn ich überhaupt noch Substanz behalten wollte. Denn das Salz löst sich ganz außerordentlich leicht in Wasser und Alkohol und kristallisiert äußerst schwer wieder aus. Ich zerlegte das Salz im Kjeldahlkolben mit 1 1/2 n. Natronlauge und fing das entweichende Ammoniak in 1 10 n. Salzsäure auf, deren Ueberschuß ich dann zurückfiltrierte.

Gebrauchte Salzsäure 1 10 n.: 3,20 cbcm

Angewandte Substanz: 0,1254 gr.

Demnach vorhandenes Ammoniak: 4,60 0.0

als NH₄ berechnet.

Die Theorie erfordert in C₁₉ H₁₂ O₃ Br (NH₄) einen Ammoniumgehalt von 4,672 0.

e) Natriumfals: Dieses Salz wurde gewonnen, indem ich in eine siedende verdünnte Sodalösung so lange ganz reine Säure eintrug, bis diese ungelöst blieb. Nach dem Abtaugen der heißen Flüssigkeit ließ ich das Filtrat im Exsiccator verdampfen, bis sich viele Kristalle abschieden. Diese habe ich dann abgeseugt und einmal aus Wasser und dann noch zweimal aus Alkohol umkristallisiert. Das Natriumfals ist ein fast farblofes, ganz fein kristallines Pulver, das sich sehr leicht in Wasser und Alkohol mit schwach gelblicher Farbe löst und sehr dazu neigt, übersättigte Lösungen von sirupartiger Konsistenz zu bilden. Eine quantitative Analyse dieses Salzes wurde nicht gemacht, da es sich zur Charakterisierung meiner Säure infolge seiner schlechten Kristallisationsfähigkeit nicht gut eignet.

IV. Oxydation der 3(?)-Brom-4-Metyl-1,1'-Naphthyl-Phenylketon-2'-Carbonsäure.

37 gr (1u 10 Mol.) der reinen bromierten Säure wurden in einer Porzellanschale auf gelinde siedendem Wasserbad in 150 cbcm


einer 51 n. Natronlauge gelöst und zu dieser schwach gelben Lösung in Portionen von je 15 cbcm eine wässrige Lösung von Kaliumpermanganat gegeben, während das Wasserbad im ganzen Verlauf der Operation seine Temperatur beibehielt. Da ich in stark alkalischer Lösung arbeitete, ging die Reduktion des Permanganates zunächst nur bis zum Manganat. Jedesmal, wenn die Farbe des Kaliumpermanganats verschwunden war, wurde eine neue Portion Lösung zugesetzt. Zum Schluß hin wurden die Zwischenräume des Zusetzens immer größer, und, als ich nach einer halben Stunde seit dem letzten Zusatz noch immer die violette Farbe behielt, nahm ich die Reaktion als beendet an. Ich hatte bis dahin so viel Permanganatlösung zugesetzt, als 60 gr (etwa 4 · 10 Mol.) festem Permanganat entspricht. Noch vorhandenes überschüssiges Kaliumpermanganat wurden dann durch Zugabe von Methylalkohol vollkommen reduziert, darauf das heiße Reaktionsgemisch abgelaugt und der auf dem Filter verbleibende Braunstein noch 2 mal mit heißem Wasser ausgewaschen. Das vollkommen klare, nur einen kleinen Stich ins gelbliche zeigende Filtrat wurde dann auf etwa $\frac{2}{3}$ seines Volumens eingeengt und erkalten lassen. In der Kälte setzte ich dann vorsichtig reine konzentrierte Salzsäure zu, und unter starkem Aufbrausen (Kohlensäureentwicklung!) erhielt ich eine starke Trübung. Im Laufe eines Tages hatte sich auf dem Boden ein schwach gelbliches feinstkristallines Pulver abgesetzt, das ich dann durch Ablassen der überstehenden Flüssigkeit isolieren konnte. Nach dem vollkommenen Trocknen erhielt ich etwa 5 gr Rohoxydationsprodukt, das ich dann noch 3 mal aus 95%igem Alkohol umkristallisierte, wobei der Schmelzpunkt vor und nach dem letzten Umkristallisieren konstant blieb. Das Oxydationsprodukt ist ein fast ganz farblos, schwach gelblicher Körper; es löst sich etwas in heißem Wasser, gut in Alkohol. Von konzentrierter Schwefelsäure wird es mit schmutzig-grüner Farbe aufgenommen und aus dieser Lösung durch Wasserzusatz wieder gefällt. Es schmilzt unter Zersetzung und Verkohlung bei 236 Grad, während bei 228 Grad schon eine leichte Verfärbung eintritt. Nach mehrwöchigem Trocknen im Exsiccator stellte ich zunächst durch Titration, die ganz analog der auf Seite 16 beschriebenen der bromierten Ausgangssäure vorgenommen wurde, fest, daß es sich um eine Dicarbonsäure handelt, und machte dann noch eine Brombestimmung.

1). Angewandte Substanz:	0,1520 gr
Verbrauchte Natronlauge 1/10 n.:	7,72 cbcm

Daraus berechnet das Molekulargewicht
einer zweibasischen Säure: 393,8

2). Angewandte Substanz:	0,1368 gr
Verbrauchte Natronlauge 1 10 n.:	6,97 cbcm
Daraus berechnet das Molekulargewicht einer zweibasigen Säure:	392,5
3). Angewandte Substanz	0,1567
Gefunden Bromsilber:	0,0736 gr
Daraus berechnet Bromgehalt:	19,99 %
4). Angewandte Substanz:	0,1255 gr
Gefunden Bromsilber:	0,0584 gr
Daraus berechnet Bromgehalt:	19,80 %

Theoretisch käme der 3(?)-Brom-1,1'-Naphthyl-Phenylketon-4,2'-Dicarbonsäure als $C_{19}H_{11}O_5Br$ das Molekulargewicht 399,01 zu, und zu einer bromierten Diphtaloylsäure gehört das Molekulargewicht 376,99 als $C_{18}H_9O_5Br$ (Formel II). Zur Kontrolle dieser Befunde habe ich dann auch einmal das Molekulargewicht




des Oxydationsproduktes auf rein physikalischem Weg. durch Ermittlung der Gefrierpunktserniedrigung von reinem Benzol, bestimmt; doch auch der so gefundene Wert lag zwischen den beiden theoretisch möglichen. Denn:

Angewandte Substanz	0,4403 gr
Angewandtes Benzol	18,423 gr
Beobachtete Gefrierpunktserniedrigung:	0.321 Teilstriche am Thermometer.

Da nun die Konstante für Gefrierpunktserniedrigung des reinen Benzols nach Hollemann 5,3 beträgt, und nach meinen Wägungen eine Konzentration von 23,8995 gr Oxydationsprodukt in 1000 gr Benzol vorlag, berechnet sich nach der Formel $M = C \cdot p / t$ (wo p die oben angegebene Konzentration, t die beobachtete Temperaturerniedrigung und C die Lösemittelkonstante bedeuten) ein Molekulargewicht von 394,6. Die erwartete Dicarbonsäure $C_{19}H_{11}O_5Br$ (Formel I) erfordert theoretisch einen Bromgehalt von 20,026 %, während die bromierte Diphtaloylsäure $C_{18}H_9O_5Br$ (Formel II) 21,2 % Brom verlangen würde.

V. Ausführung der Kalischmelze der 3(?)-Brom-4-Methyl-1,1'-Naphthyl-Phenylketon-2'-Carbonsäure.

1½ gr reinsten bromierter Säure wurden in einem Nickeltiegel mit 7 gr reinstem Aetzkali und 1–2 cbcm Wasser auf 170–180 Grad erhitzt. Es trat dabei Braunfärbung und Zersetzung ein, und man nahm den Geruch von Methylnaphtalin wahr. Nach etwa ¾ bis 1 Stunde goß ich die ganze Schmelze in Wasser und leitete durch diese alkalische Lösung so lange Wasserdampf, bis jeder Geruch nach Methylnaphtalin verschwunden war. Danach wurde der Destillationsrückstand schwach mit Schwefelsäure angesäuert und wieder 1½ Stunde Wasserdampf durchgeleitet, wobei ich am Destillat den typischen Geruch von Benzoëharz wahrnahm. Der nunmehr noch verbleibende Rückstand wurde abfiltriert und im Filtrat geringe Mengen von Brom-Jon nachgewiesen. Diese sind durch sekundäre Bromabspaltungen aus der theoretisch entstehen sollenden 1-Methyl-2-(?)-Brom-Naphtalin-4-Carbonsäure (Formel II) entstanden, wobei sich dann weiterhin Methylnaphtalin bildete. Das auf dem Filter verbliebene Harz ent-




hält noch viel Brom; doch habe ich weiter nicht versucht, aus ihm einen kristallisierenden Körper zu erhalten, da ich ja, wie ich im folgenden zeigen werde, meinen Zweck, den Nachweis zu führen, daß das Brom nicht in den Phenylrest eingetreten ist, erreicht habe. Das nach Benzoëharz riechende Destillat wurde dann stark alkalisch gemacht und darauf auf etwa den 20. Teil seines ursprünglichen Volumens eingeengt, und dann mit reiner Salzsäure aus ihm ein weisser Körper gefällt, der sich als quantitativ bromfrei erwies. Auch durch 2maliges Umkristallisieren

aus heissem Wasser konnte ich nicht den Schmelzpunkt der Benzoësäure erhalten, denn es waren ihr noch geringe Mengen von Phtalsäure beigemischt, die sich durch die Fluoreszënbildung beim Verschmelzen des Produktes mit wasserfreiem Zinkchlorid und Resorzin identifizieren ließen. Jedenfalls steht nach diesem Befund fest, daß das Brom nicht im Phenylkern gesessen hat.

VI. Versuche zur Kondensation der 3(?)-Brom-4-Methyl-1,1'-Naphtyl-Phenylketon-2'-Carbonsäure zum entsprechenden 1,2-Benzanthrachinonderivat.


3,7 gr (1/100 Mol.) der reinen bromierten Säure wurden in 55 gr konzentrierter Schwefelsäure gelöst und diese Lösung 5–6 Stunden auf dem Wasserbad bei 45–55 Grad gehalten. Danach wurde die dunkelblaue bis violette Lösung in 500 ccm Eiswasser unter stetem Rühren eingegossen. Der grösste Teil der ganzen Reaktionsmasse ging in Lösung, war demnach sulfoniert worden; ein Teil nur ballte sich zusammen und konnte aus der Lösung durch Filtrieren isoliert werden. Es war nach mehrmaligem Auswaschen, bis das Waschwasser nicht mehr sauer reagierte, und dann folgendem Trocknen ein braunes Pulver und enthielt, wie ich mit der Halogenkupferreaktion feststellte, noch das Brom. Zur Reinigung wollte ich dieses vermeintliche Chinon verküpen mit Zinkstaub und Natronlauge, konnte aber aus der tief braun-roten alkalischen Lösung durch Durchsaugen eines Luftstromes kein Chinon erhalten und beobachtete dann an einer zweiten Probe, dass das braune Pulver schon in Alkalien allein auch ohne Reduktionsmittel, löslich war. Demnach war kein chinoides Derivat entstanden. Ich habe dann das braune Pulver auf eventl. Anwesenheit einer Sulfogruppe durch Schmelzen mit Aetzkali, Salpeter und Kaliumchlorat geprüft, doch konnte ich in der Lösung dieser Schmelze mit Chlorbarium keine Schwefelsäure nachweisen. Ich habe dann noch Kondensationsversuche bei 75 Grad und 100 Grad vorgenommen, doch findet mit steigender Temperatur immer mehr Sulfonierung statt, und ich erhielt auch hierbei kein Ergebnis nach meinem Wunsche. Ging ich unter 40 Grad mit der Temperatur meiner Versuche, so fand ausser einer einfachen Lösung meiner bromierten Säure in der Schwefelsäure keine weitere Reaktion statt; und ich erhielt mein Ausgangsmaterial unverändert zurück.

VII. 4-Methyl-1,1'-Naphthyl-phenylmethan-2'-Carbonsäure.




M 32; 1007
C 1912 I; 492

Diesen von Scholl schon beschriebenen Körper erhielt ich leider bei meinem Versuch, das bromierte Derivat dieses Stoffes darzustellen. Ich erhitzte zu dem Zweck fünf Gramm meiner reinen 3(?) -Brom-4-Methyl-1,1'-Naphthyl-Phenylketon-2'-Carbonsäure mit 10 gr Zinkstaub und 100 cbcm 2 n. Natronlauge 10 Stunden lang am Rückflusskühler und saugte dann das heisse Reaktionsprodukt sofort ab. Nach dem Erkalten des Filtrates fällte ich mit reiner Salzsäure aus ihm einen schneeweißen flockigen Körper aus, der dann abgesaugt und so lange mit Wasser nachgewaschen wurde, bis das Waschwasser keine Chlor-Jon-Reaktion mehr zeigte. Die qualitative Prüfung auf Brom mit Kupferoxyd ließ Abwesenheit desselben erkennen; dagegen konnte ich in dem Filtrat nach der Fällung Brom als Jon nachweisen, was mir bestätigte, dass die alkalische Reduktion auch das Brom fortreduziert und dann den entstandenen Bromwasserstoff als Natriumbromid gebunden hat.




Nach einmaligem Umkristallisieren aus Tetrachlorkohlenstoff fand ich den Schmelzpunkt meines Reduktionsproduktes bei 182 Grad, während Scholl den der 4-Methyl-1,1'-Naphthyl-Phenyl-Methan-2'-Carbonsäure bei 183 Grad angibt. Auch die übrigen Angaben Scholls erfüllte mein Präparat, sodass an der Identität beider nicht zu zweifeln ist. Es löst sich klar in Sodalösung; konzentrierte Schwefelsäure nimmt es mit gelber Farbe auf, die schon bei Zimmertemperatur in 2-3 Minuten in dunkelrot umschlägt; diese rote Lösung liefert, wenn man sie in Wasser gießt, einen hellen chinonartigen Körper.


M 32; 1007
C 1912 I; 492




VIII. Lakton der 3(?)-Brom-4-Methyl-1,1'-Naphtyl-phenylcarbinol-2'-Carbonsäure.



M 32; 1006 Nach der Scholl'schen Vorschrift zur Darstellung des bromfreien
 C.1912 I; 492 Laktons nahm ich 5 gr reine bromierte Säure und erhitzte sie
 mit 48 gr Eisessig, 12 gr Wasser und 10 gr, granuliertem Zink
 am Rückflußkühler. Nach 1¹/₂ Stunde etwa begann sich aus
 der bisher klaren Lösung ein weißer Körper auszuschcheiden und
 nach einer weiteren Stunde saugte ich die siedende Lösung von
 noch ungelöstem Zink und bereits ausgeschiedenem Lakton ab.
 Sofort schied sich aus dem nur etwas erkalteten Filtrat eine
 Menge eines weißen Körpers aus.





Den Filtrerrückstand kochte ich noch mals mit Eisessig aus und erhielt beim Abkühlen auch dieses Filtrates eine neue Menge Lakton. Dieses Rohlakton auch aus Tetrachlorkohlenstoff umzukristallisieren, erwies sich nicht als ratsam, da keine schönen Kristalle dabei erhalten werden. Weit besser eignet sich dazu 95 % iger Alkohol, aus dem sich schon beim 2. Umkristallisieren schneeweisse Kristalle ausschieden, deren Schmelzpunkt von 170,5 Grad sich auch bei noch mehrmaligem Umkristallisieren nicht mehr weiter heben liess. Das Lakton löst sich nicht in kochender 1,1 n. Natronlauge, ist also überaus beständig. Konzentrierte Schwefelsäure löst es mit roter Farbe, die beim Erhitzen in grau-grün umschlägt. Weder in der Hitze noch in der Kälte hatte sich dabei ein Chinon gebildet. Das Lakton ist unlöslich in Wasser und Benzin: in der Kälte nur sehr schwer löslich, in Tetrachlorkohlenstoff, Methylalkohol, Aethylalkohol, Essigsäure: doch nehmen all diese letzten Lösemittel in der Hitze sehr viel Lakton auf. Die Ausbeute an Rohlakton beträgt etwa 80%, die des reinen Laktons 75% des Rohproduktes. Qualitativer Bromnachweis wurde mit positivem Erfolg mittels der Halogenkupferreaktion geführt: die quantitative Bestimmung hatte folgendes Ergebnis:

Angewandte Substanz:	0,0426 gr
Gewogen Bromsilber:	0,0224 gr
Daraus berechnet Bromgehalt:	22,38 %

während die Theorie von einem Körper $C_{19}H_{13}O_2Br$ einen Bromgehalt von 22,64 % fordert.


IX. Versuch zur Einführung der Anilidogruppe an Stelle des Broms in die 3(?) -Brom-4-Methyl-1,1'-Naphthyl-Phenylketon-2'-Carbonsäure.

5 gr reiner bromierter Säure wurden in 25 gr Anilin gelöst, und diese Lösung 9 Stunden im Oelbad unter Rückflußkühlung auf 180–200 Grad gehalten. Danach wurde das Reaktionsprodukt alkalisch gemacht und so lange Wasserdampf durchgeleitet bis im

Kondensat mit Chlorkalklösung kein Anilin mehr nachzuweisen war. Zurück blieb ein schwarzes Harz, das beim Abkühlen glänzend und spröde wurde, wie Glanzkohle. Es löste sich sehr leicht in Eisessig und in Alkohol; die alkoholische Lösung war dunkelviolett gefärbt. Auskristallisierte aus beiden Lösungen überhaupt nichts. Beim Verdunsten des Alkohols blieb eine schwarze Harzmasse zurück. Verdünnte man die alkoholische Lösung mit Wasser, so fiel ein amorpher, hellvioletter Körper aus, den ich aber unter keinen Umständen weiter reinigen konnte. Qualitativ ließ sich sowohl Brom als auch Stickstoff nachweisen; auf eine quantitative Untersuchung glaubte ich verzichten zu können, da ich ja doch keinen wohlcharakterisierten Körper vor mir hatte. Das Brom ist also so fest in meiner Säure gebunden, daß es auch durch den Ueberschuß von Anilin nicht herausgeholt wird. Dagegen vermute ich, daß die Ketongruppe in Reaktion getreten ist zu einem Körper nach Art des Benzylidenanilins, und daß darauf weitgehende Polymerisation stattgefunden hat.

X. Bromierung des 1,2-Benz-3-Methyl-Anthrachinons.

M 32; 1008 5 gr des reinen nach der Vorschrift von Scholl aus der 4-Methyl-
C 19121; 492 1,1'-Naphtyl-phenylketon-2'-Carbonsäure durch Kondensation mit konzentrierter Schwefelsäure gewonnenen 1,2-Benz-3-Methyl-Anthrachinons, das durch Verküpen mit Natronlauge und Zinkstaub gereinigt worden war, wurden in 15 cbcm Eisessig auf dem Wasserbad unter Rückflußkühlung gelöst und etwa $\frac{1}{2}$ gr Eisen als Bromüberträger zugegeben. Darauf gab ich durch den Rückflußkühler 4 gr Brom, mit Eisessig aufs 3fache Volumen verdünnt, hinzu und überließ dann das Ganze 4-5 Stunden sich selbst. Unter lebhafter Bromwasserstoffentwicklung trat sofort Reaktion ein.




Als nach der angegebenen Zeit der Raum über der Flüssigkeit farblos geworden war, wurde die Lösung zur Beendigung der Reaktion noch eine halbe Stunde im Sieden gehalten und darauf die Reaktionsmasse im Wasser gegossen, worauf sich sofort das

Chinon im Klumpen ausschied. Nach dem Abfiltrieren und Auswaschen desselben mit Wasser zeigte sich das Produkt bei der qualitativen Prüfung als bromhaltig. Eine Reinigung dieses bromierten Chinons analog der des unbromierten durch Verküpfung erwies sich als unmöglich, denn schon bei geringem Erwärmen mit 1/1 n. Natronlauge geht das Brom quantitativ heraus. Das war mir das Zeichen, daß ich auch wieder das Scholl'sche 1,2-Benz-3-Brommethyl-Anthrachinon erhalten hatte. (Formel auf der vorigen Seite) Als ich dann nach zweimaligem Umkristallisieren aus Eisessig den von Scholl angegebenen Schmelzpunkt 220 Grad, hatte ich Gewißheit, daß das Brom nicht in einen Kern eingetreten war. Ich habe darauf versucht, die Temperatur der Bromierung herabzusetzen, indem ich den niedriger siedenden Essigsäureäthylester als Lösemittel benutzte, doch auch hier ging das Brom wieder in die Seitenkette. Versuche mit Jod als Bromüberträger hatten daselbe Ergebnis. Endlich habe ich noch auf einem Uhrglas staubfeines 1,2-Benz-3-Methylanthrachinon im Sommer in einen mit Bromdämpfen gefüllten Exsiccator gebracht und denselben 14 Tage lang möglichst im Sonnenlicht stehen lassen, bis die Atmosphäre in ihm nahezu farblos geworden war. Doch auch dieses Produkt verlor beim Verküpfungsversuch sein gesamtes Brom und war demnach wieder in der Seitenkette substituiert. Wenn man also zu kernsubstituierten Bromderivaten des 1,2-Benz-3-Methylanthrachinons gelangen will, kann es nicht durch direkte Bromierung geschehen.


M 32; 1012
C 1912 I; 492

Zusammenfassung.

- I. Neu dargestellt wurde das Oxim der 4-Methyl-1,1'-Naphthyl-phenylketon-2' Carbonsäure, also:




- II. Die Bromierung dieser Säure in Eisessig liefert ein einheitliches im Naphthalinkern substituiertes Monobromderivat, dessen höchstwahrscheinliche Konstitution die einer 3(?) - Brom - 4 - Methyl-1,1'-Naphthyl-phenylketon-2' Carbonsäure ist.




- III. Es wurde diese bromierte Säure durch einige Salze charakterisiert und einige kristallographisch interessante Beobachtungen gemacht.
- IV. Bei der Oxydation liefert diese bromierte Säure eine einheitliche bromhaltige Dicarbonsäure von nicht unbedingt geklärter Konstitution.
- V. Die ausgeführte Kalischmelze liefert den Beweis, daß der Brom Eintritt nicht im Phenylkern erfolgte.
- VI. Eine Kondensation der bromierten Säure zum entsprechenden Benzanthrachinonabkömmling ist mir nicht gelungen.

VII. Bei der Reduktion in alkalischer Lösung wird das Bromherausreduziert, und man erhält die 4-Methyl-1,1'-Naphthyl-phenylmethan-2'-Carbonsäure.



VIII. Die Reduktion in essigsaurer Lösung meiner bromierten Ketonsäure führte zum 3(?) - Brom-4-Methyl-1,1'-Naphthyl-phenyl-carbinol-2'-Carbonsäure-Lakton.



IX. Ein Ersatz des Broms durch die Anilidogruppe erwies sich mir als unmöglich.

X. Unter allen Bedingungen tritt beim Bromieren des 1,2-Benz-3-Methyl-Anthrachinons Substitution der Seitenkette ein.

LEBENS LAUF

Ich, Heinrich Klös, wurde am 13. März 1901 in Barmen (Rheinland) als Sohn des Schreinermeisters Georg Klös und seiner Gattin, geb. Schäfer, geboren und gehöre, wie sie, der evangelisch-lutherischen Konfession an. Ich besuchte 3 Jahre die dortige Volksschule und bezog dann Ostern 1910 das Barmer humanistische Gymnasium, das ich Ostern 1919 mit dem Zeugnis der Reife verlassen konnte. Vom Sommersemester 1919 bis zum Wintersemester 1921/22 besuchte ich die hessische Landesuniversität zu Giessen und widmete mich dem Studium der Chemie. Am Schluß des Wintersemesters 1919/20 legte ich bei Herrn Geheimrat Prof. Dr. Elbs mein anorganisches und zu Beginn des Wintersemesters 1920/21 mein organisches Verbandexamen ab. Dann beauftragte Herr Geheimrat Prof. Dr. Elbs mich mit der Ausführung der Untersuchungen, die den Gegenstand meiner vorliegenden Arbeit bilden. Zum Schluß des Wintersemesters 1921/22 waren die Experimentaluntersuchungen für meine Arbeit abgeschlossen. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, Herrn Geheimrat Prof. Dr. Elbs meinen tiefen Dank auszusprechen für das warme Interesse, das er meinem ganzen Studium entgegenbrachte, und für die mannigfachen Anregungen, die er mir in Vorlesung und persönlichen Besprechungen gab. Auch Herrn Prof. Dr. Schneiderhöhn und Herrn Dr. Flörke sage ich vielen Dank für die Freundlichkeit, mit der sie meine erwähnten ins Gebiet der Kristallographie fallenden Untersuchungen ermöglicht und unterstützt haben. Während meiner Studienzeit besuchte ich Vorlesungen und Praktika folgender Herren Professoren: Elbs, Brand, Schaum, Meigen, König, Uller, Kaiser, Schneiderhöhn, Engel, Schlesinger.
